

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-9-7-92014123



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 11
du 3 Juillet 1992

BULLETIN A.A. - S.R.P.V. - I.N.R.A.

AGRUMES

Il convient de surveiller, contrôler le calibre des jeunes fruits afin d'intervenir en temps opportun avec CORASIL E.

Rappelons que le CORASIL E titrant 50 g/l de Dichlorpop sous forme d'ester de Butylglycol a été mis spécialement au point pour stimuler la croissance des clémentines.

Il est à utiliser à 100 cc/hl.

Epoque d'application

Intervenir à la fin de la chute physiologique des petits fruits, soit à la mi-juillet ; lorsque les fruits atteignent un diamètre moyen de 15 mm. Tester au moins 100 fruits dans le verger.

Dose d'emploi

Un litre de CORASIL E dans 1000 litres d'eau.
Traiter à fort volume d'eau soit : 2000 à 2500 l/ha.

Conseil

Ne pas mélanger à aucun autre produit phytosanitaire.
Eviter de traiter par forte chaleur (supérieur à 25°C).
Il est préférable d'irriguer les arbres avant le traitement.
Lire soigneusement les indications portées sur les emballages.

AGRUMES

Acarie

Vérifier la présence d'oeufs de larves ou d'adultes sur les feuilles avant d'intervenir.

Il y a très peu d'acaricides homologués pour les agrumes, aussi par extension d'emploi on peut utiliser avec précaution. :

- PEROPAL = Azocyclotin 30 g/hl
(attention à quelques risques de phyto)
- RUFAST = Acrinathrine
- MAITAC = Amitaaze
- ZIPAK = Amitraze + Bifenthrine
- ARTABAN = Benzoximate
- CESAR = Hexythiamate
- TECHN'ACID = Cyhénaxin.

VIGNE

Mildiou

On observe quelques cas de "Rot Brun" qui sont des attaques tardives de mildiou sur grains en cours de veraison.

Rappelons qu'à ce stade le cuivre est de nouveau recommandé.

Oidium

Le stade phénologique fermeture de la grappe est sensible.

Maintenir la protection car l'oïdium est virulent. Viser les grappes.

Dans les cas graves des interventions au Permanganate à 150 g/hl sur tous les rangs avec un minimum de 400 l/ha (compléter la protection dans les 24h par un soufre poudrage ou pulvérisation).

Ou bien utiliser le Karathane à 0,600 g/ha.

Botrytis

Intervenir dans les parcelles sensibles à cette maladie et aux attaques de vers de la grappe qui favorisent le développement du champignon.

(Voir tableau des spécialités).

Vers de la grappe

Très peu de ponte sur grains. Surveiller attentivement.

AMANDIERS

On observe des attaques de c

PRODUITS HOMOLOGUES CONTRE LA POURRITURE GRISE

SPECIALITES COMMERCIALES	MATIERES ACTIVES	FIRME	DOSE l ou kg/ha
SUMISCLEX	procymidone	Sopra	1,5
RONILAN	vinchlozoline	Basf	1
RONILAN FL	"	"	1
KIDAN	iprodione	Rhodiagri	3
ROVRAL		Littorale	1,5
RONILAN SP	vinchlozoline+ soufre	Rsr	30
SILBOS DF	vinchlozoline+ thirame	Basf	5
DIRAC EXPRESS	iprodione + thirame	Rhodiagri Littorale	6
BENLATE 50 DF	bénomyl	Du Pont	1
NBS SPECIALITES	carbendazime	-	1
PELT 44 liquide	thiophanate- méthyl	Procida	3
SUMICO	diéthofencarbe+ carbendazime	Sopra	2
EUPARENE	dichlofluanide	Bayer	4
NBS SPECALITES	folpel	-	3
BASULTRA DF	thirame	Basf	4
RHODIASAN	"	Rhodiagri Littorale	"
BANKO CT 50	clorothalonil+ thirame	Marty Parazols	7
ORGANIL 648	thiophanate- méthyl + folpel	Procida	5
BTF	folpel + thirame + carbendazime	Pépro	3,5

AMANDIERS

On observe des attaques sensibles de Tenthrédes . Espèces de petites limaces noires visqueuses qui rongent l'épiderme supérieur des feuilles.

Une pulvérisation de "Phosalone" est conseillée en cas de pullulation.

Acariens

Attention aux attaques d'acariens

Intervenir avec les produits suivants :

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| - TECHN'ACID | = | Cyhéxatin |
| - PEROPAL | = | Azocyclotin |
| - OMITE | = | Propargite |
| - CESAR | = | Hexythiazox |
| - CASCADE | = | Flufénoxuron |
| - ARTABAN | = | Benzoximate |

---> Alternier les produits pour éviter les accoutumances.
Mouiller abondamment.

CULTURES MARAICHERES

Doryphores

Protéger vos aubergines contre les attaques de doryphores.

Intervenez sur les larves jeunes de la grosseur d'un grain de blé. Elles sont plus vulnérables à ce stade.

Intervenir avec les produits suivants ::

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| - FASTAC | KAFIL SUPER | TECHN'UFAN | ZOLONE FLO |
| - SEPIZIN L | SHERPA 10 | SUMICIDIN 10 | IMIDAN |
| - SEVIN L 85 | CYMBUSH | MAVRIK | DIMECRON 10 |
| - BIRLANE CE 40 | DECIS | KARATE ULTRACIDE | |
| - BAYTHROID | DECIS FLO | AZOFENE FLO | |

-----0000000-----

(C) - S.R.P.V. - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.